

**Informează-te doar din surse verificate și sigure!**

# **C****VID-19**

**REPUBLICA MOLDOVA: ADMINISTRAREA DOZEI  
BOOSTER DE VACCIN ÎMPOTRIVA COVID-19: CE  
REPREZINTĂ ACEASTA ȘI CUI ÎI ESTE  
RECOMANDATĂ?**





REPUBLICA MOLDOVA: ADMINISTRAREA DOZEI BOOSTER DE VACCIN ÎMPOTRIVA COVID-19: CE REPREZINTĂ ACEASTA ȘI CUI ÎI ESTE RECOMANDATĂ?

Acest material apare în cadrul Proiectului "Asigurarea informării corecte și combaterea dezinformării în pandemia COVID-19", implementat de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS) cu suportul financiar al Fundației Soros-Moldova/Departamentul Sănătate Publică. Informațiile prezentate în acest material nu sunt împărtășite neapărat de Fundația Soros-Moldova.

## **Republica Moldova: Administrarea dozei booster de vaccin împotriva COVID-19: Ce reprezintă aceasta și cui îi este recomandată?**

Doza booster de vaccin împotriva COVID-19 reprezintă doza administrată persoanelor care au finalizat schema primară de vaccinare. De menționat că, după o anumită perioadă, imunitatea obținută de la dozele inițiale de vaccin începe să scadă în mod natural. Astfel, pentru persoanele care prezintă un risc sporit de a dezvolta forme grave de boală și deces se recomandă administrarea dozei booster la un interval de șase luni pentru vaccinurile cu schema primară de două doze și de cel puțin două luni (56 de zile) pentru vaccinul Janssen/Johnson&Johnson, în conformitate cu Schema de vaccinare pentru administrarea dozei booster de vaccin împotriva COVID-19 din tabelul de mai jos. Testarea nivelului de anticorpi înainte de administrarea dozei booster nu este recomandată.

### **Persoanele eligibile pentru administrarea dozei booster de vaccin împotriva COVID-19:**

**1. Personalul din instituțiile medico-sanitare, indiferent de tipul de proprietate și formă juridică de organizare, inclusiv din:**

- secțiile de reanimare din ATI;
- secțiile spitalicești cu specific de tratament COVID-19;
- asistența medicală primară;
- asistența medicală urgentă prespitalicească;
- asistența medicală spitalicească;
- serviciile de diagnostic și laborator;
- serviciile stomatologice;
- farmacii;
- serviciile de dializă, transfuzii și transplant;
- medici rezidenți, elevi, studenți cu profil medical;
- angajații Agenției Naționale pentru Sănătate Publică.

**2. Personalul și beneficiarii din cadrul azilurilor și centrelor de plasament temporar sau de lungă durată:**

- personalul din cadrul centrelor de plasament cu profil medico-social/social;
- personalul care acordă îngrijiri medicale și sociale la domiciliu;
- asistenții sociali comunitari;
- personalul din cadrul instituțiilor balneo-sanatoriale/reabilitare/recuperare.

**3. Persoanele cu vârsta de peste 60 de ani.**

**4. Persoanele din categoria de vârstă 18 - 60 de ani, cu comorbidități pentru care infecția COVID-19 prezintă un risc sporit de dezvoltare a formelor grave și de deces.**

**5. Angajații structurilor de menținere și asigurare a ordinii publice, apărării și securității, statului, inclusiv ambasade, parlament, președinție, guvern, ministere, instituții subordonate acestora, agenții, organizații sindicale, autorități publice locale și angajații sistemului penitenciar.**

**6. Lucrătorii din domeniul de educație.**

**7. Personalul din cadrul serviciilor sociale.**

**Tabel: Schema de vaccinare pentru administrarea dozei booster de vaccin împotriva COVID-19**

Denumirea vaccinului	Tipul vaccinului	Doze booster de vaccin anti-COVID-19	Termen de administrare
<b>Comirnaty (Pfizer/BioNTech)</b>	ARN messenger	Comirnaty Pfizer/BioNTech (0,3ml) sau Spikevax/Moderna (0,25ml)	La un interval de cel puțin 6 luni de la doza 2
<b>Spikevax (Moderna)</b>	ARN messenger	Comirnaty Pfizer/BioNTech (0,3ml) sau Spikevax/Moderna (0,25 ml)	La un interval de cel puțin 6 luni de la doza 2
<b>Vaxzevria (AstraZeneca)</b>	Vector viral nereplicativ	Comirnaty Pfizer/BioNTech (0,3 ml) sau Spikevax/Moderna (0,25ml) sau Vaxzevria (Astra Zeneca) (0,5ml)	La un interval de cel puțin 6 luni de la doza 2
<b>Janssen Johnson&amp;Johnson</b>	Vector viral nereplicativ	Comirnaty Pfizer/BioNTech (0,3ml) sau Spikevax/Moderna (0,25 ml) sau Janssen Johnson&Johnson (0,5ml)	La un interval de cel puțin 2 luni de la doza 1
<b>Gam-COVID-Vac (Sputnik V)</b>	Vector viral nereplicativ	Comirnaty Pfizer/BioNTech (0,3 ml) sau Spikevax/Moderna (0,25 ml) sau Janssen Johnson&Johnson (0,5 ml)	La un interval de cel puțin 6 luni de la doza 2
<b>CoronaVac (Sinovac)</b>	Virus inactivat	Comirnaty Pfizer/BioNTech (0,3 ml) sau Spikevax/Moderna (0,25 ml) sau Janssen Johnson&Johnson (0,5 ml) sau CoronaVac (Sinovac) (0,5ml)	La un interval de 3-6 luni de la doza a doua
<b>Sinopharm</b>	Virus inactivat	Comirnaty Pfizer/BioNTech (0,3 ml) sau Spikevax/Moderna (0,25 ml) sau Janssen Johnson&Johnson (0,5 ml) sau Sinopharm (0,5ml)	La un interval de cel puțin 6 luni de la doza 2

\* Moderna (spikevax) - Doza booster constă din jumătate din cantitatea de ser utilizat pentru schema de vaccinare primară.

Sursa: <https://vaccinare.gov.md/questions>

